

Helicobacter Pylorin analysointiin vaikuttavat lääkkeaineet

Tutkittaessa Helicobakter Pylori –infektiota ulosteesta tulee huomioida, että useat lääkkeaineet vaikuttavat analyysitulokseen. Oikean tuloksen saamiseksi tiettyjen lääkkeaineiden välttäminen ennen näytteen ottamista on tärkeää. Alla on listattuna lääkkeainekohtaiset varoajat ennen näytteen ottamista.

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa yhteen (1) vuorokauteen ennen tutkimusta

Suolahapon erityksen estäjät; Cytotec, Famotidin Hexal, Pepcid, Pepcid Duo, Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranitidin Sandoz, Ranixal, Zantac.

Suolen motiliteettiin vaikuttavat lääkkeaineet; Primperan, Prepulsid, Mestinon, Ubretid Takeda Pharma

Antasidit; Balacid Novum, Galieve, Gaviscon, Link, Magnesiummaito, Rennie

Limakalvon suoja-aineet; Antepsin

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa kahteen (2) viikkoon ennen tutkimusta

Kaikki kuuriluonteiset antibioottihoidot

Protonipumpun estäjät; Esomeprazol, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Gasterix, Lanzoprazol Actavis, Losec, Losec MUPS, Nexium, Omeprazol Actavis, Omeprazol Pensa, Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad, Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Pensa, Pantoprazol Sandoz, Panzor, Pariet, Somac, Somac Control, Zolt.

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa neljään (4) viikkoon ennen tutkimusta

Helikobakteerin häätöhoidot; Helipak A, Helipak K

Muut lääkkeet eivät vaikuta Helikobakteerin analysointiin, ja niitä voi ottaa normaalisti.